






Instrukcja przygotowania do kolonoskopii planowanej w godzinach porannych (do godz. 13.00)

	Dieta	Zastosowanie preparatu przeczyszczającego
2 dni (48 godzin) przed badaniem	Dieta ubogoresztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata. Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy, barwiących soków (np. buraczane).	
1 dzień (24 godziny) przed badaniem 	Lekkostrawne śniadanie: Lekka herbata, bułeczka Godz.14-15.00 przecedzony bulion Po godz. 15.00 koniec spożywania pokarmów. Można: pić wodę, herbatę, ssać landrynki, jeść miód	O godz. 16.00 Rozpuścić 4 saszetki preparatu FORTRANS w 4 litrach niegazowanej wody (1 saszeta/1litr wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut
w dniu badania	Do czasu badania nie spożywać pokarmów Do 2 godz. przed planowaną godziną badania można pić dowolną ilość płynów niegazowanych i klarownych (także herbata, kawa bez mleka) Można ssać landrynki	OSOBY REGULARNIE PRZYJMUJĄCE LEKI: NASERCOWE, PRZECIWNADCIŚNIENIOWE, PRZECIWPADACZKOWE ZAŻYWAJĄ PORANNĄ DAWKĘ.



Instrukcja przygotowania do kolonoskopii planowanej w godzinach między 13.00 – 18.00

	Dieta	Zastosowanie preparatu przeczyszczającego
2 dni (48 godzin) przed badaniem	Dieta ubogoresztkowa, lekkostrawna - ryż, makaron, bulion, chleb (bez nasion), gotowane mięso i ryby, przecedzone soki, herbata. Nie należy spożywać: owoców zawierających drobne pestki (np. winogrona, kiwi), mleka, kawy, barwiących soków (np. buraczane).	
1 dzień (24 godziny) przed badaniem 	Lekkostrawne śniadanie: Lekka herbata, bułeczka Godz.15-17.00 przecedzony bulion Po godz. 17.00 koniec spożywania pokarmów. Można pić wodę, herbatę, ssać landrynki, jeść miód	O godz. 18.00 Rozpuścić 2 saszetki preparatu FORTTRANS w 2 litrach niegazowanej wody (1 saszeta/1litr) wypić w tempie 1 szklanka co 15 minut
w dniu badania 	Do czasu badania nie spożywać pokarmów Do 2 godz. przed planowaną godziną badania można pić dowolną ilość płynów niegazowanych i klarownych (także herbata, kawa bez mleka) Można ssać landrynki	Około 6:00 rano należy przygotować 2 litry roztworu Fortrans , rozpuszczając pozostałe 2 torebki preparatu Fortrans, każdą w 1litrze niegazowanej wody. Przygotowany roztwór należy wypić w przeciągu 2 godzin, 1 szklanka co 15 minut.
OSOBY REGULARNIE PRZYJMUJĄCE LEKI: NASERCOWE, PRZECIWNADCIŚNIENIOWE, PRZECIWPADACZKOWE ZAŻYWAJĄ PORANNĄ DAWKĘ.		