

Informacje dla pacjenta – biopsja gruboigłowa pod kontrolą USG

Biopsja gruboigłowa pod kontrolą ultrasonografii (USG) jest małoinwazyjną procedurą diagnostyczną wykonywaną w celu pobrania wycinków tkankowych z podejrzanej zmiany w piersi do badania histopatologicznego.

Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym. Zmiana lokalizowana jest przy użyciu głowicy ultrasonograficznej, co umożliwia precyzyjne wprowadzenie igły biopsyjnej.

Po dezynfekcji skóry i podaniu środka znieczulającego lekarz wykonuje niewielkie nacięcie skóry, a następnie wprowadza igłę biopsyjną i pobiera kilka wycinków tkankowych z obszaru wymagającego diagnostyki. W niektórych przypadkach, w zależności od wielkości i charakteru zmiany, może dojść do jej niemal całkowitego lub całkowitego usunięcia w trakcie biopsji, jednak procedura ta ma charakter przede wszystkim diagnostyczny i nie jest standardowo metodą leczenia.

W wybranych przypadkach, po wykonaniu biopsji, może zostać pozostawiony znacznik tkankowy (klips), umożliwiający identyfikację miejsca biopsji w przyszłych badaniach obrazowych lub w przypadku leczenia operacyjnego.

Po zakończeniu procedury zakładany jest opatrunek uciskowy. Czas trwania zabiegu wynosi zazwyczaj od 10 do 20 minut.

Możliwe powikłania miejscowe obejmują przede wszystkim: ból w miejscu biopsji, krwiak, krwawienie, obrzęk lub przejściowy dyskomfort. Rzadko mogą wystąpić zakażenie, przedłużone krwawienie lub reakcja na zastosowane znieczulenie miejscowe.

Należy podkreślić, że żadna procedura medyczna nie daje gwarancji całkowitego wyeliminowania ryzyka powikłań, nawet przy jej prawidłowym wykonaniu.

Zabieg przeprowadzany jest w warunkach zapewniających nadzór personelu medycznego oraz możliwość natychmiastowego udzielenia pomocy. Objawy niepożądane mogą wystąpić zarówno bezpośrednio po zabiegu, jak i w okresie

kilku dni po jego wykonaniu. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów po opuszczeniu placówki medycznej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przygotowanie do zabiegu

Lekki posiłek jest dopuszczalny przed zabiegiem. Leki stałe należy przyjąć zgodnie z zaleceniem lekarza. Należy poinformować personel o uczuleniach na leki, zaburzeniach krzepnięcia oraz o przyjmowanych lekach przeciwkrzepliwych lub przeciwplatekcyjnych. W przypadku karmienia piersią należy poinformować o tym lekarza przed zabiegiem. W większości przypadków biopsja może być wykonana bez konieczności przerywania karmienia.

Postępowanie po biopsji

Opatrunek uciskowy utrzymać zgodnie z zaleceniem (zwykle 24 godziny). Przez co najmniej 24 godziny unikać intensywnego wysiłku i dźwigania. W razie narastającego krwawienia, szybko powiększającego się krwiaka, gorączki, duszności lub uogólnionej pokrzywki należy w trybie pilnym skontaktować się z placówką/lekarzem.