



Pobieranie plwociny na posiew

informacja dla pacjenta

Cel badania	Wykrycie, identyfikacja i określenie lekowrażliwości bakterii stanowiących potencjalną przyczynę zakażenia w obrębie dolnych dróg oddechowych
Badania laboratoryjne	Posiew plwociny
Uwagi ogólne	Prawidłowo pobrana plwocina jest materiałem odkrztuszonym z dolnych dróg oddechowych. Posiew tego materiału wykonuje się przy podejrzeniu bakteryjnego zapalenia płuc i/lub oskrzeli. W Laboratorium każda próbka jest weryfikowana metodą mikroskopową pod względem przydatności diagnostycznej. Z próbek niespełniających kryteriów weryfikujących dla plwociny (materiał niediagnostyczny = ślina) nie wykonuje się posiewu.
Pojemniki	Jałowy, zakręcany pojemnik jednorazowego użytku z szerokim wlotem
Przygotowanie do badania	• Materiał pobrać w godzinach porannych (najlepiej po przerwie nocnej), na czczo lub co najmniej 4 godziny po ostatnim posiłku. • Usunąć protezy zębowe, nakładki nazębne, ruchomy aparat ortodontyczny. • Dokładnie przepłukać jamę ustną i gardło jałową lub przegotowaną wodą.
Instrukcja pobrania plwociny	1. Opisać jałowy pojemnik, do którego będzie pobierana plwocina, imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz datą i godziną pobrania materiału. 2. Odkrztusić plwocinę do pojemnika w objętości nie mniejszej niż 1 ml. Należy wykonać tzw. głębokie odksztuszanie, aby pobrany materiał pochodził z dolnych dróg oddechowych. Nie należy pobierać śliny! 3. Szczelnie zamknąć pojemnik i przekazać materiał do Punktu Pobrań ZDL.
Warunki przechowywania i transportu	Materiał dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godz. od pobrania, transportując próbkę w temperaturze pokojowej.